

COVID-19 ΜΕΘ

- Ασθενής στη ΜΕΘ διασωληνωμένος
- Ακολουθούμε τις γενικές Οδηγίες του **Surviving Sepsis Campaign [Guidelines on the Management of Critically Ill: Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]** (Υπάρχουν στο site της ΕΠΕ)

Φαρμακευτική αγωγή

Αζιθρομυκίνη (Zythromax)

500mg άπαξ ημερησίως επί 7 ημέρες (ΠΡΟΣΟΧΗ για πιθανή καρδιοτοξικότητα) (σύσταση με ανεπαρκή δεδομένα)

μαζί με

Χλωροκίνη (Plaquenil)

400mg ανά 12ωρο την πρώτη ημέρα και 200mg x 2 τις επόμενες 7-14 ημέρες (ΠΡΟΣΟΧΗ για πιθανή καρδιοτοξικότητα) (σύσταση με ανεπαρκή δεδομένα)

+/-

λοπιναβίρη/ριτοναβίρη (kaletra)

400mg /100mg ανά 12ωρο για 7-14 ημέρες (Σε περίπτωση διαρροιών, μπορεί να γίνει χρήση αντιδιαρροϊκών φαρμάκων, αν κριθεί αναγκαίο)

Σημείωση: Στα πλαίσια εγκεκριμένης κλινικής μελέτης (από ΕΟΦ, Επιτροπή Ηθικής του Νοσοκομείου), μετά από έγγραφη συγκατάθεση των συγγενών, μπορεί να χορηγηθούν και φάρμακα μελέτης (πάντα χορηγούμενα δωρεάν, στα πλαίσια της μελέτης – ο κίνδυνος να θελήσουν να πουλήσουν οι εταιρείες φάρμακα μέσω «Μελετών» Φάσης 4 είναι μεγάλος !!!!), π.χ , *remdesivir*, *τοσιλιζουμάμπη (tocilizumab, σκεύασμα Actemra)*